

Клінічне ситуаційне завдання

Чоловік Д., 68 років

Скарги: генералізований біль у животі, посилюється при рухах, ніщо його не полегшує. Відчуття здуття живота. Апетиту немає.

Анамнез захворювання: біль почався приблизно 2 дні тому. Почався навколо пупка, а потім по всьому животу. Біль поступово збільшується по інтенсивності. Особливої іррадіації немає. Біль оцінює у 7 балів. Такого болю раніше не було. Була нудота і 6 разів блювота, останні 2 рази містила тільки жовч. Останнє випорожнення 3 дні назад.

Анамнез життя: хворіє ІХС, переніс стентування коронарних судин. Приймає аспірин і бісопролол.

Фізикальне обстеження: ЧСС: 100/хв, регулярні; АТ 130/65 мм рт. ст.; Темп. 37,3° С; ЧД 19/хв; Насичення O₂ 93%. Симптом Валя, симптом Ківуля, симптом Склярова.

Завдання студенту:

1. Опитати скарги.
2. Анамнез захворювання.
3. Анамнез життя.
4. Провести фізикальне обстеження.
5. Сформулювати попередній діагноз.
6. Інтерпретація лабораторних досліджень.
7. Інструментальні методи обстеження.
8. Лікувальна тактика.