

Клінічне ситуаційне завдання

Пацієнт К., 35 років

Скарги: різкий колючий біль у лівій половині грудної клітки та відчуття нестачі повітря, задишка.

Анамнез захворювання: декілька годин тому під час фізичного навантаження раптово з'явився різкий колючий біль у лівій половині грудної клітки та відчуття нестачі повітря.

Анамнез життя: туберкульоз, вірусний гепатит, венеричні захворювання заперечує.

Шкідливі звички: куріння.

Алергічні реакції на медикаменти та харчові продукти не спостерігаються.

Фізикальне обстеження: стан хворого важкий, свідомість ясна. Хворий покритий холодним потом. Артеріальний тиск 110/70 мм рт.ст., пульс 110 уд/хв. Частота дихання – 28 разів в 1 хв. Виражена важкість під час вдиху повітря через посилення болю. Аускультативно – везикулярне дихання зліва послаблене. Перкуторно – високий тимпаніт. Дихання справа везикулярне. Живіт при пальпації м'який, неболючий. Перистальтика задовільна.

Симптом Пастернацького від'ємний з обох сторін.

Сечовиділення вільне.

Завдання студенту:

1. Опитати скарги.
2. Анамнез захворювання.
3. Анамнез життя.
4. Провести фізикальне обстеження.
5. Сформулювати попередній діагноз.
6. Інтерпретація лабораторних досліджень.
7. Інструментальні методи обстеження.
8. Лікувальна тактика.