

1. Анемія у випадку хронічної ниркової недостатності обумовлена:
  - А. Зниженням еритропоезу;
  - Б. Підвищенням рівня сечовини в сироватці крові;
  - В. Дефіцитом заліза;
  - Г. Кровотечею;
  - Д. Гіпопротейнемією
  
2. Для якої анемії характерні: наявність в стернальному пункті великої кількості мегалобластів, затримка дозрівання гранулоцитів при нормальній кількості мегакаріоцитів?
  - А. Залізодефіцитної;
  - Б. В<sub>12</sub>-фолієво-дефіцитної;
  - В. Постгеморагічної;
  - Г. Віпопластичної;
  - Д. Набутої гемолітичної
  
3. Для якої анемії характерні: поєднання гемолітичної жовтяниці і спленомегалії?
  - А. Постгеморагічної;
  - Б. Хвороби Е. Маркіфава – Ф. Мікелі;
  - В. Хвороби Т. Адісона – А. Бірмера;
  - Г. Залізодефіцитної;
  - Д. Хвороби Г. Мінковського - А.М. Шоффара
  
4. Основною скаргою пацієнта у якого верифіковано загострення хронічної обструктивної хвороби легень є:
  - А. Задуха експіраторного характеру
  - Б. Задуха інспіраторного характеру
  - В. Постійна задуха інспіраторного характеру, важкість якої наростає
  - Г. Постійна задуха змішаного характеру, важкість якої наростає
  - Д. Гіпертермія.
  
5. У пацієнтів з хронічною обструктивною хворобою легень аускультативно вслуховуються:
  - а) Везикулярне дихання;
  - б) Вологі дрібноміхурцеві хрипи;
  - в) Крепітація;
  - г) Шум тертя плеври;
  - д) Свистячі хрипи.
  
6. Чим обумовлений больовий синдром за умов хронічного гепатиту?
  - а) Застоем жовчі в жовчних ходах;
  - б) Розтяганням капсули печінки;
  - в) Супутнім холециститом;
  - г) Супутнім панкреатитом;

д) Портальною гіпертензією

7. Для функціональної диспепсії характерне ?

- а) Відсутність морфологічних змін шлунка;
- б) Виразки стравоходу;
- в) Виразки шлунка;
- г) Анемія;
- д) Метаплазія епітелію кардіального відділу шлунка

8. Які показники із дослідження плевральної рідини вказують на ексудативний характер випоту. Виберіть правильне твердження:

- а) Співвідношення вмісту білка випіт/сироватка крові  $> 0,5$ ;
- б) Високий вміст еритроцитів;
- в) Співвідношення вмісту білка випіт/сироватка крові  $< 0,5$ ;
- г) Вміст білка  $< 30$  г/л ;
- д) Відносна густина до 1,000

9. Які величини артеріального тиску характеризують 1 ступінь артеріальної гіпертензії:

- а) 175/100 – 190/110 мм рт. ст.;
- б) Нижче 140/90 мм рт. ст.;
- в) 160/95 – 179/100 мм рт. ст.;
- г) 140/90 – 159/94 мм рт. ст.;
- д) Вище 200/110 мм рт. ст.

10. Під час об'єктивного обстеження пацієнтки М. 54 р., верифіковано пульсацію сонних артерій («танок каротид»). Для якої вади серця це характерно:

- а) Мітральної недостатності;
- б) Аортальної недостатності ;
- в) Недостатності клапана легеневої артерії;
- г) Аортального стенозу;
- д) Мітрального стенозу

11. До «малих» критеріїв системної склеродермії не належить:

- а) Остеоліз кінчиків пальців як результат ішемії;
- б) Склеродактилія;
- в) Фіброз базальних відділів легень;
- г) Проксимальна склеродермія;
- д) «Сотова легеня» на рентгенографії ОГК

12. До позасуглобових проявів, характерних для хвороби Г. Рейтера, відносяться:

- а) Кон'юнктивіт;
- б) Поліміозит;

- в) Пієлонефрит;
- г) Кератит;
- д) Гепатит

13. У випадку якої хвороби, найчастіше верифікується лейкоцитурія?

- а) Гострий пієлонефрит;
- б) Нефротичний синдром;
- в) Гострий нефрит;
- г) Амлоїдоз нирок;
- д) Рак сечового міхура

14. До виникнення яких процесів не призводить атеросклероз ниркових артерій:

- а) Тубуло-інтерстиціального нефриту;
- б) Атрофії канальців нирки;
- в) Розростання (збільшення кількості) сполучної тканини в інтерстиції нирок;
- г) Нефросклерозу;
- д) Інфарктів нирки