КЛІНІЧНА СТАНЦІЯ

№	Елементи виконання	Бали за виконання		
		виконав	частково виконав	не виконав
1.	Студент привітався і представився	0.1	0.05	0
2.	Сформулював попередній діагноз	0.1	0.05	0
3.	Обґрунтував, на підставі яких даних поставив попередній діагноз	0.1	0.05	0
4.	Оцінив наявні результати лабораторного/інструментального обстеження	0.1	0.05	0
5.	Призначив план подальшого обстеження хворого	0.1	0.05	0
6.	Обґрунтував діагностичні можливості додаткових досліджень	0.1	0.05	0
7.	Вказав місце подальшого лікування хворого, обґрунтував режим дня та принципи дієтичного харчування	0.1	0.05	0
8.	Призначив план лікування, назвав групи медикаментів, приклади препаратів та їх дозування	0.1	0.05	0
9.	Обґрунтував призначене медикаментозне лікування	0.1	0.05	0
10.	Надав рекомендації щодо реабілітації хворого, призначив профілактичні заходи	0.1	0.05	0
Максимальна кількість балів		1.0		

ПРАКТИЧНІ СТАНЦІЇ

1 ЕКГ

№	Елементи виконання методики	Бали за виконання		
		виконав	частково виконав	не виконав
1.	Студент привітався і представився	0.1	0.05	0
2.	Визначив вольтаж ЕКГ та джерело збудження (водій ритму)	0.1	0.05	0
3.	Визначив регулярність та частоту ритму	0.1	0.05	0
4.	Визначив положення електричної осі серця та електричну систолу QT	0.1	0.05	0
5.	Визначив провідність: виміряв інтервали PQ (PR), QRS	0.1	0.05	0
6.	Провів аналіз зубця P (тривалість і амплітуда в II відведенні, двофазність у V1) та зубця Q (наявність у двох суміжних відведеннях, тривалість і амплітуда)	0.1	0.05	0
7.	Провів аналіз зубця R і S: наявність хвилі Δ, висота R у aVL, співвідношення R/S у V1 і V6, вольтажний індекс Соколова-Лайона; визначив, є чи нема гіпертрофії камер серця, а якщо є, то назвав ознаки виявленої гіпертрофії	0.1	0.05	0
8.	Визначив, є чи нема порушень ритму чи провідності серця, а якщо є, то назвав ознаки виявленої аритмії чи	0.1	0.05	0

	блокади			
9.	Провів аналіз інтервалу ST (зміщення сегменту ST від ізолінії донизу чи догори) та зубця T (негативний T) у двох суміжних відведеннях	0.1	0.05	0
10.	Визначити, є чи нема ішемії або інфаркту міокарда, а якщо є, то назвати ознаки, локалізацію ішемії чи інфаркту, форму (з підйомом ST, з зубцем Q) й фазу інфаркту	0.1	0.05	0
Максимальна кількість балів за станцію		1.0		

Ан КРОВІ, Ан СЕЧІ

№	**Елементи виконання методики**	Бали за виконання		
		виконав	частково виконав	не виконав
1.	Студент привітався і представився	0.1	0.05	0
2.	Оцінив вміст гемоґлобіну в крові (130-160 ґ/л – для чоловіків; 120-140 ґ/л – для жінок), еритроцитів (4-5x10^{12}/л – для чоловіків; 3,9-4,7x10^{12}/л – для жінок), ретикулоцитів (5-15‰), тромбоцитів (180-320x10^{9}/л), лейкоцитів (4-9x10^{9}/л)	0.1	0.05	0
3.	Оцінив середній об’єм еритроцитів (MCV) (82-98 фл); середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) (27-33 пґ), КП (0,85-1,15), ознаки гіпер/гіпохромії, мікро/макроцитозу	0.1	0.05	0
4.	Оцінив лейкоцитарну формулу: паличкоядерні нейтрофіли (1-5%); сеґментоядерні нейтрофіли (50-72%); лімфоцити (18-38%); еозинофіли (1-5%); базофіли (0,5-1,0%); моноцити (2-10%); мієлоцити, метамієлоцити, плазмоцити, бласти (в нормі відсутні)	0.1	0.05	0
5.	Оцінив ШОЕ (1-10 мм/год для чоловіків; 2-15 мм/год для жінок); наявність анізо- та пойкілоцитозу, гіперсеґментації нейтрофілів, тілець Жоллі, кілець Кебота, тіней Боткіна–Гумпрехта	0.1	0.05	0
6.	Оцінив і назвав причини зміни кольору сечі (норма – світло-жовтий) та питомої густини сечі (1002-1030)	0.1	0.05	0
7.	Інтерпретував наявність в сечі білка (0,033 ґ/л, сліди), мінімальна протеїнурія <1 ґ/л; помірна 1-3 ґ/л; масивна ≥3 ґ/л; еритроцитів (0-1 в п.з.); назвав причини масивної протеїнурії та макрогематурії	0.1	0.05	0
8.	Інтерпретував наявність лейкоцитів в сечовому осаді (0-1 в п.з.) та бактеріурії (якщо більше 1x10^{5}/мл); можливі причини змін	0.1	0.05	0
9.	Інтерпретував наявність в сечовому осаді циліндрів; епітеліальних клітин; кетонових тіл	0.1	0.05	0
10.	Зробив висновок про результати дослідження			
Максимальна кількість балів за станцію		1.0		

ЕхоКГ

№	**Елементи виконання методики**	**Бали за виконання**		
		виконав	частково виконав	не виконав
1.	Студент привітався і представився	0.1	0.05	0
2.	Оцінив та інтерпретував розмір правого та лівого шлуночка	0.1	0.05	0
3.	Оцінив та інтерпретував розмір лівого передсердя та діаметр висхідної аорти	0.1	0.05	0

4.	Оцінив та інтерпретував товщину міжшлуночкової перетинки та задньої стінки лівого шлуночка в діастолу	0.1	0.05	0
5.	Оцінив фракцію викиду лівого шлуночка, назвав критерій систолічної дисфункції	0.1	0.05	0
6.	Оцінив стан мітрального та трикуспідального клапанів (недостатність, стеноз, розходження стулок клапанів, кальциноз, вегетації)	0.1	0.05	0
7.	Оцінив стан аортального та легеневого клапанів (недостатність, стеноз, розходження стулок клапанів, кальциноз, вегетації)	0.1	0.05	0
8.	Оцінив сегментарну скоротливість лівого шлуночка (нормальна, гіпо- чи акінезія)	0.1	0.05	0
9.	Оцінив наявність легеневої гіпертензії (є, немає), рідини в порожнині перикарда (є, немає)	0.1	0.05	0
10.	Оцінив діастолічну дисфункцію (є, немає)	0.1	0.05	0
Максимальна кількість балів		1.0		