

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Освітньо - кваліфікаційний рівень магістр

Галузь знань 22 Охорона здоров'я

Спеціальність 221 Стоматологія

Семестр 8

Навчальна дисципліна Хірургічна стоматологія

Екзаменаційний білет № 1

Тестові завдання (80 завдань) (україномовна форма навчання)

Затверджено на методичному засіданні кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Протокол № 7 від 7 лютого 2023 р.

Завідувач кафедри _____ проф. Варес Я.Е.

Затверджено на засіданні профільної методичної комісії стоматологічного факультету

Протокол № 1 від 16 лютого 2023 р.

Голова профільної методичної комісії _____ проф. Варес Я.Е.

Чоловік 33-х років скаржиться на біль у язиці справа, що посилюється під час прийому їжі та при розмові. Об'єктивно: на боковій поверхні язика, ближче до кореня, болісна виразка розміром 0,6 см у діаметрі. Дно вкрите сірим нальотом. Коронка зуба 47 зруйнована. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Декубітальна виразка
- B. Трофічна виразка
- C. Твердий шанкр
- D. Туберкульозна виразка
- E. Ракова виразка

Постраждалий 38-ми років доставлений у відділення щелепно-лицевої хірургії з діагнозом: інфікована різана рана правої щічної ділянки. Травму отримав 10 годин тому. Який вид хірургічної обробки рани застосує лікар?

- A. Первинна рання хірургічна обробка
- B. Первинна відстрочена хірургічна обробка
- C. Вторинна рання хірургічна обробка
- D. Вторинна пізня хірургічна обробка
- E. Первинна пізня хірургічна обробка

Хворий 24-х років надійшов до клініки з діагнозом: перелом альвеолярного відростка лівої верхньої щелепи на ділянці 25, 26, 27 зубів без зміщення. Яку шину слід застосувати для постійної іммобілізації?

- A. Гладка шина-скоба
- B. Шина з зачіпними петлями
- C. Шина з розпорочним вигином
- D. Шина з похилою площиною
- E. Шина Васильєва

На прийом до хірурга-стоматолога звернулася пацієнтка 70-ти років для видалення центральних різців верхньої щелепи, що мають рухомість III ступеню. Який інструмент слід застосувати?

- A. Прямі щипці
- B. Прямий елеватор
- C. Дзьобоподібні щипці
- D. Байонетні щипці
- E. S-подібні щипці

До стоматолога звернулася хвора, 45-ти років, зі скаргами на припухлість в ділянці верхньої губи. Об'єктивно: визначається асиметрія обличчя за рахунок набряку верхньої губи, носогубна згортка згладжена. В ротовій порожнині відзначається згладженість перехідної згортки на рівні 12, 11 та 21 зубів, гіперемія слизової оболонки в ділянці цих зубів, під час пальпації припухлості відчувається біль та флюктуація. Діагностовано гострий гнійний періостит верхньої щелепи від 11. Оберіть тактику хірургічного лікування. Що в себе включає медикаментозне лікування даної пацієнтки? Які зміни в крові будуть при даній патології?

- A. Збереження 11, періостотомія
- B. Видалення 11
- C. Антибіотикотерапія, протизапальна, десенсибілізуюча, загальноукріплююча терапія
- D. Антибіотикотерапія, протизапальна терапія
- E. Лейкоцитоз, нейтрофільний зсув вліво, еозінопенія, лімфопенія, збільшення ШОЕ
- F. Лейкопенія, еозінопенія, лімфоцитоз, базофілія

У хворого, 37 років, в ділянці верхньої губи зліва відзначається набряк та щільний інфільтрат округлої форми розміром 1x1 см, спаяний з прилеглими тканинами. Шкіра над ним синюшного кольору. В центрі інфільтрату видніється гнійний стрижень. Встановіть діагноз. Яке ускладнення найчастіше виникає при даному захворюванні? Препарати якої групи

включають у комплексне лікування даного захворювання для профілактики цього ускладнення?

- A. Фурункул
- B. Карбункул
- C. Тромбофлебіт лицевих вен
- D. Парез лицевого нерва
- E. Антикоагулянти та антибіотики
- F. Протеолітичні ферменти та антибіотики

Хворий 45-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на постійний ниючий біль в 48. Показано видалення 48. Відкривання рота обмежене до 1 см. Оберіть метод місцевого знечудження. Оберіть інструменти, необхідні для видалення зуба.

- A. Щипці, зігнуті по площині
- B. Гладилка
- C. Мандибулярна анестезія
- D. Торусальна анестезія
- E. S-подібні праві щипці
- F. Дзьобоподібні щипці з вузькими щічками
- G. Кюретажна ложка
- H. Анестезія за Берше-Дубовим

Хворий 32 років отримав опік обличчя і шиї під час вибуху легкозаймистої речовини. Доставлений в травмпункт. Очні щілини закриті внаслідок набряку повік, на шкірі підборіддя, щік, носа, чола, верхніх відділів передньої поверхні шиї на фоні гіперемованої шкіри відзначаються великі напружені міхури. Визначте ступінь опіку та вкажіть, які шари шкірних покривів уражені? Який відсоток поверхні тіла уражений?

- A. Опік II-го ступеню.
- B. Опік I-го ступеню.
- C. Епідерміс.
- D. Дерма.
- E. 9%.
- F. 18%.