

## **ЗАКЛЮЧНИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ** **для ТУ «Дитяча гастроентерологія»**

**1. Для нападу гострого холецистити характерні всі ознаки, окрім:**

- A. Болючість у правому верхньому квадранті живота при глибокому диханні (с-м Мерфі)
- B. Інтенсивний біль у правому підребер'ї або в епігастрії
- C. Зникнення симптомів після випорожнення кишечника
- D. Лихоманка
- E. Лейкоцитоз

**2. Відомо, що причиною розвитку печінкової енцефалопатії можуть бути всі перераховані стани, окрім:**

- A. Закрепів
- B. Шлункової кишкової кровотечі
- C. Спонтанного бактеріального перитоніту
- D. Прийому седативних препаратів
- E. Антибактеріальної терапії

**3. Інтенсивний нападopodobний біль в правому підребер'ї, який іноді іррадіює у праве плече, праву лопатку, притаманний:**

- A. Гіперкінезії жовчного міхура з гіпотонією сфінктерів.
- B. Гіперкінезії жовчного міхура з гіпертонією сфінктерів.
- C. Гіпокінезії жовчного міхура з гіпотонією сфінктерів.
- D. Гіпокінезії жовчного міхура з гіпертонією сфінктерів.

**4. Варіант гострого інфекційного гепатиту, який не переходить у хронічний гепатит:**

- A. Інфекційний гепатит В.
- B. Інфекційний гепатит С.
- C. Інфекційний гепатит Д.
- D. Інфекційний гепатит Е.

**5. Клінічний симптом, що не входить до синдрому портальної гіпертензії:**

- A. Асцит.
- B. Спленомегалія.
- C. Малиновий язик.
- D. Формування колатерального кровообігу.

**6. Які препарати показані при болях в правому підребер'ї, що обумовлені гіпотонічною дискінезією жовчних шляхів?**

- A. анальгетики
- B. холецистокінетики
- C. седативні
- D. спазмолітики
- E. ферментні

**7. Які сучасні препарати, що застосовують в лікуванні калькульозного холецистити, володіють літогенним ефектом?**

- A. фестал, дигестал, панзинорм
- B. церукал, реглан
- C. сірепар
- D. хенофальк, урсофальк

**8. Які з перерахованих препаратів не показані для купіювання больового синдрому при жовчній кольці?**

- A. атропін
- B. папаверін
- C. нітрогліцерин
- D. морфін
- E. анальгін

**9. Що входить у поняття «синдром мальабсорбції»?**

- A. Порушення всмоктування їжі
- B. Порушення перетравлення їжі
- C. Анемія, лейкопенія
- D. блювота та нудота
- E. Гіповітаміноз

**10. Які лікарські речовини призначають при порушеній моторній функції кишок?**

- A. Ферменти
- B. Спазмолітики, прокінетики
- C. М-холінолітики
- D. Анаболічні стероїди
- E. Антациди

**11. Які клітини не присутні в тонкій кишці?**

- A. Бокаловидні
- B. Ендокриноцити
- C. G-клітини
- D. Ентероцити
- E. Міжепітеліальні лімфоцити

**12. За допомогою якої артерії здійснюється кровопостачання тонкої кишки?**

- A. Шлунково-дуоденальної
- B. Селезінкової
- C. Верхньобрижеечної
- D. Нижньобрижеечної
- E. Верхньопрямкишкової

**13. Що відноситься до осмотичних послаблюючих засобів:**

- A. Харчові волокна
- B. Препарати сени
- C. Препарати крушини
- D. Гуталакс
- E. Форлакс

**14. Що характерне для дії імодіуму:**

- A. Прокінетичний ефект
- B. Гепатопротекторний ефект
- C. Обезболючий ефект
- D. Седативний ефект
- E. Все вище перераховане

**15. При вираженому метеоризмі краще призначати:**

- A. Но-шпа

- В. Мезим-форте
- С. Ентеросгель
- Д. Смекта
- Е. Пробіотики

**16. Який з перерахованих симптомів НЕ може бути при целиакії?**

- А. Безбольові проноси
- В. Прогресування симптомів
- С. Стеаторея
- Д. Хронічні закрепи
- Е. Непереносимість глютену

**17. До ускладнень целиакії не відносяться?**

- А. Діарея
- В. Лімфома тонкої кишки
- С. Негранулеманозний ентерит
- Д. Колагенова спру
- Е. Нейропатія

**18. З метою діагностики муковісцидозу призначають:**

- А. Визначення хлоридів поту
- В. Генетичне дослідження
- С. Визначення еластази 1 калу
- Д. Визначення назального потенціалу
- Е. Все вище перераховане

**19. Позитивний щодо діагнозу муковісцидозу вважається рівень хлоридів поту понад:**

- А. понад 30 ммоль/л
- В. Понад 60 ммоль/л одноразово
- С. Понад 60 ммоль/л у 2-3 визначеннях
- Д. Понад 40 ммоль/л
- Е. . Понад 50 ммоль/л

**20. Що характерне для дисахаридної ентеропатії:**

- А. Вазоспастичні реакції
- В. Відчуття «грудки» при ковтанні
- С. Розлади сечовипускання
- Д. Непереносимість молока
- Е. Сексуальна дисфункція