

Приклад екзаменаційного білету
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

Приклад тестового завдання з однією правильною відповіддю (40 завдань)

Імперативні галюцинації, які зустрічаються у клінічній картині параноїдної шизофренії належать до виду:

- A) Зорові галюцинації
- B) Слухові галюцинації
- C) Нюхові галюцинації
- D) Вісцеральні галюцинації
- E) Тактильні галюцинації

Приклад тестового завдання з множинними відповідями (40 завдань):

Серед запропонованих груп препаратів оберіть ті, які рекомендовані як препарати першого вибору при депресивному епізоді з симптомами тривоги

- A) Типові антипсихотики
- B) Інгібітори моноамінооксидази
- C) Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну
- D) Інгібітори ацетилхолінестерази

Приклад ситуаційної задачі у вигляді клінічного випадку (1 задача)

Пацієнтка, 24р. З анамнезу відомо, що спадковість неврологічними та психічними захворюваннями не обтяжена. За характером з дитинства вразлива, дуже емоційна, схильна до надмірних переживань, гіперболізації. Психічний стан порушився гостро, через декілька годин після того, як потрапила у дорожньо-транспортну пригоду за участю автівки, де сиділа поруч з водієм. Пацієнтка дуже злякалася, в подальшому стала свідком того, як лікарі надавали допомогу людям з іншої машини з численними травмами. Після транспортування пацієнтки у лікарню для огляду жодних тілесних травм та пошкоджень не виявлено, однак у психічному стані пацієнтки спостерігалися зміни: постійно посміхалася, потім почала голосно плакати та кричати, на запитання відповідала недоречно, вживала слова лише в зменшувальних формах, не змогла назвати свого прізвища та імені, дати народження, не могла сказати, де перебуває в даний момент, що сталося з нею напередодні. На прохання лікаря роззутися почала повністю знімати з себе одяг, в подальшому одягати взуття на руки, не могла послуговуватися ручкою до письма, оскільки не знала, як писати. У зв'язку з цим скерована на консультацію до психіатра.

Психічний стан. Свідомість звужена, пацієнтка дезорієнтована в часі та просторі. Вербальному контакту важкодоступна. Міміка жвава, гротескна: заочує очі, витягує губи. Пацієнтка важко втримується на місці, постійно намагається кудись бігти, метушлива. Мислення непослідовне, на запитання дає «мимо-відповіді», відповідає недоречно, вживає слова у зменшувальних формах. Інструкцій лікаря не може виконати або виконує їх недоречно: на прохання поставити підпис - використовує ручку, як ложку, імітуючи нею процес вживання їжі. Емоції неадекватні до ситуації, сміх швидко змінюється сильним плачем. Функціонування у когнітивній оцінці неможливо. Критика до свого стану страждає.

Соматичний статус. синусова тахікардія. АТ - 140/85 мм рт ст. З боку внутрішніх органів та систем без патології.

Неврологічний статус. Патологічні рефлекси відсутні, менінгіальні симптоми відсутні. З боку ВНС - гіпергідроз долонь та стоп, легкий тремор пальців рук.

Дані лабораторних та інструментальних досліджень. У загальному аналізі крові, сечі, біохімічному аналізі крові змін не виявлено.

1. Визначте ведучий психопатологічний синдром (основні симптоми захворювання)

2. Встановіть клінічний діагноз