

Лімфедема кінцівок

1. Якою найчастіше буває етіологія лімфедemi:

- A.** Усе вказане – невірно
- B.** Усе вказане – вірно
- C.** Травматична
- D.** Посттромботична
- E.** Інфекційна

2. набряк при лімфедемі:

- A.** Немає чіткої локалізації
- B.** Носить мігруючий характер
- C.** Майже завжди локалізується на тильній поверхні стопи
- D.** Майже завжди локалізується на підшві стопи
- E.** Частіше буває двобічним

3. набряки при лімфедемі нижніх кінцівок:

- A.** Зменшуються від перебування в горизонтальному положенні з припіднятою ногою
- B.** Зменшуються від застосування сечогінних середників
- C.** Часто дуже рихлі, втиснення після натискання пальцем залишаються навідь від незначного зусилля
- D.** Збільшуються під кінець дня, після фізичного навантаження
- E.** Часто дуже щільні, втиснення після натискання пальцем залишаються лише при значному зусиллі

4. Шкіра при лімфедемі тривалий час залишається незмінною, однак згодом розвивається:

- A.** Вітіліго
- B.** Кандидомікоз
- C.** Гіпертрихоз
- D.** Гіперкератоз
- E.** Веррукоз

5. Загальною ознакою лімфедemi є:

- A.** Безболісний набряк ураженої кінцівки, який спочатку появляється в ділянці ступні, а потім розповсюджується в проксимальному напрямку
- B.** Болючий набряк ураженої кінцівки, який спочатку появляється в ділянці ступні, а потім розповсюджується в проксимальному напрямку
- C.** Безболісний набряк ураженої кінцівки, який спочатку появляється на гомілці, а потім розповсюджується в дистальному напрямку
- D.** Болючий набряк ураженої кінцівки, який спочатку появляється на гомілці, а потім розповсюджується в дистальному напрямку
- E.** Безболісний набряк ураженої кінцівки, який спочатку появляється на гомілці, а потім розповсюджується на іншу кінцівку